

عوامل تاثیر گذار بر قابلیت هضم مواد مغذی در خوراک دام سنگین



۱- تغذیه بیش از حد

گاو تحت تأثیر تغذیه بیش از حد قرار می گیرد و اغلب علائم نفخ، سوء هاضمه و اتساع حاد را نشان می دهد. همچنین گونه های باکتریایی در شرایط تغذیه بیش از حد در روده سم تولید می کنند که جذب آن باعث ایجاد بیماری می شود



۲- سوء تغذیه

کمبود طولانی مدت ویتامین ها و مواد معدنی معمولاً منجر به ایجاد بیماری های تغذیه ای می شود که می تواند آسیب های جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد. کمبود سایر عوامل، مانند انرژی یا پروتئین نیز رشد گاو را به تاخیر می اندازد



۳- تولید خوراک دام

خوراک دام آماده تغذیه را بهبود می بخشد و مکمل های مفید نیز به آن افزوده می شود. اما آسیاب کردن مواد اولیه ممکن است در برخی موارد بر قابلیت هضم تأثیر منفی بگذارد که تأثیر آن بسته به درجه خرد شدن متفاوت است



۴- دفعات خوراک دهی

هنگامی که گاو روزانه ۵-۶ بار خوراک دریافت کند، pH ثابتی در شکمبه بین ۵/۵ تا ۵/۸ خواهد داشت، اما زمانی که فقط ۱-۲ بار در روز تغذیه شود، مقدار pH بین ۵/۱ به ۷/۱ در هر روز متفاوت خواهد بود



۵- عوامل محیطی

عوامل محیطی متعددی می توانند بر مصرف خوراک در گاو تأثیر بگذارند، مانند: استرس گرمایی، باران، صدا و ارتفاع زیاد



۶- عوامل فردی

چندین فاکتور مختلف مانند سن، بارداری و سطح ورزش می توانند بر مصرف خوراک توسط گاو تأثیر بگذارند





نشانی: تهران، میدان توحید، خیابان شهید
امیرلو، خیابان شهید طوسی، پلاک ۱۷۰، طبقه ۲
کد پستی: ۱۵۷۴۷۱۸۹۵۱ تلفن: ۶۶۹۴۹۱۰۳ (۰۲۱)
فکس: ۶۶۹۰۰۲۳۰ (۰۲۱) موبایل: ۰۹۱۹۵۰۴۰۳۷۱
ایمیل: info@irfia.ir وبسایت: www.irfia.ir

